



Liste des vermifuges pour chat et spectre d'activité

Nom du vermifuge	Principe actif	Forme galénique	Spectre d'activité
Advocate	moxidectine + imidaclopride	spot-on en application unique (ne pas administrer au chat de moins de 9 semaines et de moins de 1 kg)	Actif sur les ascaris et les ankylostomes Inactif sur les taenias et sur le Dipylidium
Ascatène	pyrantel + niclosamide	comprimés	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Actif sur les ténias et le Dipylidium
Dolthene (pas d'AMM pour le chat)	praziquantel	suspension orale à administrer pendant 3 j	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Actif sur les ténias et sur le Dipylidium
Droncit	praziquantel	comprimés ou injection (ne pas administrer à des chatons)	Actif sur les ténias et sur le Dipylidium
Drontal	pyrantel + praziquantel	comprimés (à ne pas administrer à des cha- tons âgés de moins de 15 jours)	Actif sur les formes adultes d'ascaris et d' ankylostomes Actif sur le Dipylidium
Flubenol	Flubendazole	pâte orale à administrer 2 jours de suite (à ne pas administrer à des cha- tons âgés de moins de 15 jours)	Actif sur les ascaris et les ankylostomes Actif sur les ténias Inactif sur le Dipylidium
Milbemax (chat)	milbemycin + oxime+ praziquantel	comprimés (à ne pas administrer à des cha- tons âgés de moins de 6 semaines ou de moins de 500gr)	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Actif sur les ténias et sur le Dipylidium
Panacur (pas d'AMM pour le chat)	fendendazole	comprimés solubles dans l'eau	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Actif sur les ténias Inactif sur le Dipylidium
Profender (chat)	emodepside+ praziquantel	spot-on (à ne pas administrer à des cha- tons âgés de moins de 8 semaines ou de moins de 500gr)	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Actif sur les ténias et sur le Dipylidium
Stromiten	lévamisole + niclosamide	comprimés (à ne pas administrer à des cha- tons âgés de moins de 3 mois)	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Actif sur les ténias et sur le Dipylidium
Stronghold	sélamectine	Spot-on (à ne pas administrer à des chatons âgés de moins de 6 semaines)	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Inactif sur les taenias et sur le Dipylidium
Strongid (chat)	pyrantel	Pâte orale (à ne pas administrer à des cha- tons âgés de moins de 2 semaines)	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Inactif sur les taenias et sur le Dipylidium
Thelmin KH	mébendazole	Comprimés à administrer pen- dant 2 ou 5 jours. (à ne pas administrer à des cha- tons âgés de moins de 2 semaines)	Actif sur les ascaris Actif sur les ankylostomes Inactif sur les taenias et sur le Dipylidium
Vitaminthe	oxibendazole+ niclosamide	Pâte orale (à ne pas administrer à des cha- tons âgés de moins de 2 semaines)	Actif sur les ascaris et sur les ankylostomes Actif sur les ténias et sur le Dipylidium